

## Ocorrência do gavião-belo *Busarellus nigricollis* no estado de Santa Catarina

Cássio Amaral

Rua Mato Grosso, 562, ap. 32, Água Verde, 80620-070, Curitiba, PR, Brasil. E-mail: cassiobio@yahoo.com.br

Recebido em 16 de janeiro de 2002; aceito em 14 de maio de 2002.

**ABSTRACT.** *Busarellus nigricollis* possesses an ample geographic distribution in Latin America, being the State of Parana considered the meridional limit of this species in Brazil. This work seeks to contribute to the acquaintance about the geographic distribution of this animal. In the 29<sup>th</sup> of November, 1999, was observed an exemplary in the city of Santa Cecília, State of Santa Catarina.

**KEY WORDS:** *Busarellus nigricollis*, geographic distribution, plateau, Santa Catarina State.

**PALAVRAS-CHAVE:** *Busarellus nigricollis*, distribuição geográfica, planalto, Santa Catarina.

O gavião-belo *Busarellus nigricollis* é uma ave de ampla distribuição, do México à Argentina, e em quase todo o Brasil. Geralmente sua ocorrência está associada à presença de extensos banhados, pântanos, campos inundados e manguezais, isso porque, apesar de se alimentar de vários insetos e pequenos vertebrados, seu principal alimento são os peixes (Sick 1997). O presente trabalho visa a contribuir para um melhor conhecimento da distribuição desta espécie, uma vez que não foi citada a sua ocorrência no estado de Santa Catarina, na obra de Rosário (1996). Sick (1997) considerou o estado do Paraná como sendo o limite meridional de sua distribuição geográfica, no Brasil. Scherer-Neto e Straube (1995) citam três ocorrências para a ave, no oeste paranaense. No dia 29 de novembro de 1999, foi observado um animal adulto, de sexo indeterminado, que foi identificado e diferenciado de outros Accipitridae, pela coloração beje escura e ferrugínea do corpo, cabeça branca, com uma mancha negra no papo e pela cauda extremamente curta. Estava em repouso sobre um tronco (a 2,5 metros do solo, e a 8 metros da margem da Rodovia BR 116, entre os quilômetros 133 e 138), numa área de extensa monocultura

de *Pinus* sp., no município de Santa Cecília, no planalto catarinense. A sua presença no local está, provavelmente, associada a um enorme lago artificial, que existe próximo à área onde foi observado, devido a construção de uma represa.

### AGRADECIMENTOS

Agradeço o apoio do Instituto de Pesquisas Cananéia – IPEC, e o auxílio de Itamar Homem do Amaral, Viviane Amaral e Michelle Pereira de Sousa.

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Rosário, L. A. do (1996) *As aves em Santa Catarina, distribuição geográfica e meio ambiente*. Florianópolis: FATMA.
- Scherer-Neto, P. e F. C. Straube (1995) *Aves do Paraná, história, lista anotada e bibliografia*. Curitiba: Ed. dos autores.
- Sick, H. (1997) *Ornitologia brasileira*. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira.