

Novo limite sul na distribuição geográfica de *Sakesphorus cristatus* (Thamnophilidae)

Miguel Ângelo Marini^{1,2} e Leonardo Esteves Lopes^{1,3}

¹ Departamento de Biologia Geral, Universidade Federal de Minas Gerais, 30161-970, Belo Horizonte, MG, Brasil.

² Endereço atual: Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília, 70910-900, Brasília, DF, Brasil. E-mail: marini@unb.br

³ Endereço atual: Pós-graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, Departamento de Biologia Geral, I.C.B., Universidade Federal de Minas Gerais, 30161-970, Belo Horizonte, MG, Brasil

Recebido em 27 de janeiro de 2005; aceito em 22 de março de 2005

ABSTRACT. Southern range extension for the Silvery-Cheeked Antshrike (*Sakesphorus cristatus*, Thamnophilidae). We report the occurrence and associated range extension of the Silvery-Cheeked Antshrike (*Sakesphorus cristatus*) in the Ribeirão do Campo Municipal Park, in the municipality of Conceição do Mato Dentro, in Minas Gerais, Brazil. The geographic range of the Silvery-Cheeked Antshrike was extended 220 km to the southeast due to this sighting.

KEY-WORDS: Espinhaço, range extension, *Sakesphorus cristatus*, Thamnophilidae.

PALAVRAS-CHAVE: Espinhaço, extensão geográfica, *Sakesphorus cristatus*, Thamnophilidae.

Sakesphorus cristatus é um Thamnophilidae até recentemente conhecido apenas para as caatingas do nordeste Brasileiro (Pinto 1978, Ridgely e Tudor 1994, Sick 1997, Zimmer e Isler 2003). Nos últimos anos, diversos registros documentaram a existência desta espécie no médio rio São Francisco, especificamente nos municípios de Montalvânia, Manga, Mocambinho, Tejuco, Jaíba, Pirapora e Várzea da Palma, sendo que este último município consiste no limite sul de sua distribuição conhecida (Kirwan *et al.* 2001, Kirwan *et al.* 2004, L.E.L. obs. pessoal).

No dia 28 de setembro de 2000, observamos um macho de *S. cristatus* adulto em uma capoeira no Parque Municipal Ribeirão do Campo (PMRC, 19°04'35''S, 43°33'00''W), distrito de Tabuleiro, pertencente ao município de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais (figura 1). A vocalização típica da espécie (Isler e Whitney 2002) foi gravada por M.Â.M. e será depositada no Arquivo Sonoro Prof. Elias Coelho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

O PMRC possui cerca de 3150 ha e localiza-se na Serra do Intendente, Cadeia do Espinhaço, município de Conceição do Mato Dentro. A paisagem é composta basicamente de campos limpos, matas de galerias, matas semidecíduas e campos rupestres, sendo a primeira fitofisionomia dominante na região (L. E. L. obs. pess.). Este novo registro estende a distribuição conhecida da espécie em cerca de 220 km ao sudeste de Várzea da Palma e mais de 300 km ao sul do limite da caatinga, de onde é considerado endêmico por Sick (1997). Este também é o primeiro registro da espécie para a bacia do Rio Doce, onde se localiza integralmente o PMRC.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro e ao Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais pelo suporte ao trabalho. Marcelo Ferreira de Vasconcelos confirmou a identificação da vocalização da espécie. Um revisor anônimo apresentou importantes contribuições ao manuscrito.




Figura 1. Mapa do sudeste do Brasil indicando Conceição do Mato Dentro, local do primeiro registro de *Sakesphorus cristatus* para a bacia do rio Doce. Também foram incluídos alguns recentes registros da espécie para o médio rio São Francisco.

Figure 1. Map of southeast Brazil indicating Conceição do Mato Dentro where the first record of *Sakesphorus cristatus* for the Rio Doce basin was made. Also included some recent records of this species for the middle portion of the São Francisco river.

REFERÊNCIAS

- Isler, P. R. e B. M. Whitney. (2002). *Songs of the Antbirds - Thamnophilidae, Formicariidae, and Conopophagidae* (CD de áudio). Ithaca: Macaulay Library of Natural Sounds, Cornell Laboratory of Ornithology.
- Kirwan, G. M., J. M. Barnett e J. Minns. (2001). Significant ornithological observations from the Rio São Francisco Valley, Minas Gerais, Brazil, with notes on conservation and biogeography. *Ararajuba* 9:145-161.

- Kirwan, G. M., J. M. Barnett, M. F. Vasconcelos, M. A. Raposo, S. D'Angelo Neto e I. Roesler. (2004). Further comments on the avifauna of the middle São Francisco Valley, Minas Gerais, Brazil. *Bull Br Ornithol Club* 124:207-220.
- Pinto, O. M. O. (1978). *Novo Catálogo das Aves do Brasil*. São Paulo: Empresa Gráfica da Revista dos Tribunais.
- Ridgely, R. S. e G. Tudor. (1994). *The Birds of South America, vol. 2, the suboscine passerines*. Austin: University of Texas Press.
- Sick, H. 1997. *Ornitologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.
- Zimmer, K. J. e M. L. Isler. (2003). Family Thamnophilidae (Typical Antbirds), p. 448-681. In: J. del Hoyo, A. Elliot e D. Christie (ed.) *Handbook of the Birds of the World, vol. 8, broadbills to tapaculos*. Barcelona: Lynx Edicions.