

First record of the Variable Seedeater (*Sporophila americana*) for the state of Maranhão, Brazil

Marcelo Ferreira de Vasconcelos

Coleção Ornitológica, Departamento de Zoologia, ICB, Universidade Federal de Minas Gerais, C.P. 486, 31270-901, Belo Horizonte, MG, Brasil. E-mail: bacurau.salsa@bol.com.br

Recebido em 19 de abril de 2004; aceito em 07 de outubro de 2004

RESUMO. Primeiro registro da coleira-do-norte (*Sporophila americana*) no estado do Maranhão, Brasil. A coleira-do-norte (*Sporophila americana*) distribui-se no Brasil ao longo da bacia do Amazonas, da região do baixo Rio Negro até o Amapá e o Pará, e no extremo oeste da Amazônia Brasileira. No dia 16 de março de 2004, dois machos foram observados e tiveram suas vocalizações gravadas em áreas de vegetação secundária localizadas às margens do córrego Água Branca (04°53'S, 47°25'W), município de Açaílândia, Maranhão, Brasil. Estes são os primeiros registros desta espécie para o estado do Maranhão.

PALAVRAS-CHAVE: distribuição geográfica, Emberizidae, Maranhão, *Sporophila americana*.

KEY WORDS: geographic distribution, Emberizidae, Maranhão, *Sporophila americana*.

The Variable Seedeater (*Sporophila americana*) occurs from Mexico to northern South America (Ridgely & Tudor 1989, Sick 1997). In Brazil, its distribution is known from lower Rio Negro area across the Amapá state and east to Belém region, and in westernmost Amazon region (Ridgely & Tudor 1989, Sick 1997). Here I report the first record of this species in Maranhão state, northeastern Brazil.

On 16 March 2004, I observed and tape-recorded two males of Variable Seedeater along Água Branca stream (04°53'S, 47°25'W), Açaílândia municipality, western Maranhão state, Brazil. These birds were in secondary vegetation on both margins of this stream. One individual was observed imitating the song of the Great Kiskadee (*Pitangus sulphuratus*), which is a common species in the study area. Sick (1997) also reports that the Variable Seedeater imitates voices of other bird species. Copies of the tape recordings were deposited at Arquivo Sonoro Prof. Elias Coelho (ASEC), Department of Zoology, Federal University of Rio de Janeiro.

This is the first record of the Variable Seedeater for Maranhão state (Oren 1990, 1991). This species was not observed in a previous study carried out in the region (Almeida 2001). Considering the lack of records for the Variable Seedeater in recent surveys (Oren 1990, 1991, Almeida 2001), it is likely that this species reached Açaílândia region following the intense deforestation during the last decades. Alternatively the Variable Seedeater can

perform seasonal movements or could have been released in the region by illegal animal dealers.

ACKNOWLEDGEMENTS

I thank Sete Soluções e Tecnologia Ambiental for supporting my fieldwork at Maranhão state. M. Maldonado-Coelho kindly revised draft versions of the manuscript. J. A. Silva, P. F. Cruz, and L. A. Mendes helped to obtain the geographic coordinates of the study site.

REFERENCES

- Almeida, A. (2001) *Diversidade, abundância e conservação de aves em habitats secundários da pré-Amazônia Maranhense, Brasil*. Tese de Mestrado. Piracicaba: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo.
- Oren, D. C. (1990) New and reconfirmed bird records from the state of Maranhão, Brazil. *Goeldiana Zool.* 4:1-13.
- Oren, D. C. (1991) Aves do estado do Maranhão, Brasil. *Goeldiana Zool.* 9:1-55.
- Ridgely, R. S. e G. Tudor (1989) *The birds of South America*, v. 1. Austin: University of Texas Press.
- Sick, H. (1997) *Ornitologia Brasileira*. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira.